

¿QUÉ PUEDO HACER?

En nuestro país la disfunción eréctil afecta a:

Hombres entre 25 y 70 años



¿En qué consiste la disfunción eréctil?

Se trata de la incapacidad de conseguir o mantener una erección lo suficiente para permitir una relación sexual satisfactoria.

¿Por qué se produce?

En los cuerpos cavernosos del pene hay unas cavidades llamadas "sinusoides" que cuando se produce un estímulo sexual se llenan de sangre y se produce la erección.

Entre los 60 y 70 años tiene una prevalencia



¿Qué tipos de disfunción eréctil existen?



VASCULAR: cuando hay problemas en el llenado y retención de sangre en los sinusoides (cavidades en el pene encargadas de la erección).



NEUROLÓGICA: cuando existen problemas en la transmisión de los estímulos que el cerebro y la médula espinal envían al pene.



HORMONAL: por ejemplo, cuando el organismo produce menos hormona masculina (testosterona) de la que se necesita.



POR MEDICAMENTOS: el tratamiento de enfermedades como la hipertensión o la depresión afectan negativamente a la función eréctil.



PSICOLÓGICA: miedo a no conseguir una erección, problemas de pareja, depresión, estrés u otros problemas psicológicos pueden afectar al acto sexual.

Sin embargo, **la disfunción eréctil tiene solución, ¡consulta a tu médico!**

- FÁRMACOS TÓPICOS
- FÁRMACOS ORALES
- OTROS TRATAMIENTOS (terapia intracavernosa, terapia intrauretral, terapia hormonal, dispositivos de vacío, prótesis peneana)
- ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO

**ACUDE AL ESPECIALISTA,
ÉL TE VA A PRESCRIBIR LO MEJOR PARA TÍ**